



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Farmacologia Informa

REAÇÕES ADVERSAS CAUSADAS PELO "KIT COVID-19"

O QUE É O "KIT COVID-19"?



Farmacologia Informa

Combinado

Risco aumentado do desenvolvimento de tromboembolismo venoso, adenoma hepatocelular, colestase (em mulheres com histórico) e da doença da vesícula biliar, além de piorar o prognóstico de mulheres com câncer de mama.

Isolado

Sangramento irregular, menor tolerância para atrasos, efeitos hipoestrogênicos e redução dos níveis de HDL no caso dos injetáveis, dores de cabeça fortes e piorar no prognóstico de mulheres com câncer de mama

PERIGOS DO USO OFF-LABEL



Farmacologia Informa

O uso off label de um medicamento ocorre quando ele é usado de forma diferente daquela aprovada pela ANVISA (que consta na bula) e deve ser baseado em evidências científicas de qualidade.


No entanto, pode representar risco para o paciente quando o medicamento é utilizado em um esquema terapêutico (dose e tempo) diferente, sem estudos clínicos que indiquem sua eficácia e segurança.

ESTUDOS AVALIANDO AS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS NA PANDEMIA A RESPEITO DAS REAÇÕES ADVERSAS GRAVES A MEDICAMENTOS COMO AOS DO "KIT COVID-19" EM PACIENTES INFECTADOS SÃO PREOCUPANTES.


CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA



Farmacologia Informa



São utilizados no tratamento e profilaxia da malária, podendo ser usados também no tratamento de lúpus eritematoso, artrite reumática e outras doenças.



Durante a pandemia a venda de hidroxiclороquina aumentou em quase 118% no Brasil. Estudos mostraram que o uso dos dois medicamentos aumentou o desenvolvimento de reações adversas graves, como eventos cardiovasculares em pacientes com COVID-19.

AZITROMICINA



Farmacologia Informa

É usado no tratamento de infecções bacterianas.



Junto com a cloroquina e a hidroxicloroquina, são os medicamentos mais associados a riscos cardiovasculares durante a pandemia. Além de causar diarreias e aumentar os níveis de transaminases (enzimas hepáticas).



A azitromicina vem sendo relacionada ao aumento da mortalidade quando em associação com a hidroxicloroquina.



IVERMECTINA




Farmacologia Informa



É usado no tratamento de infecções parasitárias.



O seu uso na COVID-19, muitas vezes em doses acima das consideradas seguras, podem causar: diarreia, náusea, perda ou diminuição da força muscular, dor abdominal e hepatite medicamentosa.



No Brasil, a venda da ivermectina durante a pandemia aumentou quase 557%.

ATENÇÃO!



Farmacologia Informa

Até o momento, nenhum dos medicamentos utilizados no "kit COVID-19" possuem evidência científica sobre sua eficácia e segurança na prevenção e tratamento da COVID-19.



A Associação Médica Brasileira (AMB) declarou que seu uso deve ser banido por falta de eficácia tanto no tratamento quanto na prevenção na COVID-19.



Campus UFRJ-Macaé
Professor Aloísio Teixeira

REFERÊNCIAS



Farmacologia Informa

- Associação Médica Brasileira. Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid-19. Boletim 02/2021.
- Guia farmacoterapêutico o tratamento de pacientes hospitalizados com a Covid-19 / Conselho Federal de Farmácia. – Brasília: Conselho Federal de Farmácia, 2021.
- Conselho Federal de Farmácia – Brasil – Notícia: 04/02/2021 – Venda de remédios sem eficácia comprovada contra Covid dispara. <https://www.cff.org.br/noticia.php?id=6197&titulo=Venda+de+rem%C3%A9dios+sem+efic%C3%A1cia+comprovada+contra+a+Covid+dispara>. Acessado 13 de abril de 2021.
- MELO, José Romério Rabelo et al. Reações adversas a medicamentos em pacientes com COVID-19 no Brasil: análise das notificações espontâneas do sistema de farmacovigilância brasileiro. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 37, n. 1, e00245820, 2021.
- 14^o Boletim de Farmacovigilância – Eventos adversos aos medicamentos utilizados durante a pandemia de Covid-19: dados de revisões sistemáticas. Janeiro/2021.
- Conselho Federal de Farmácia – Brasil – Notícia: 10/03/2021 – De diarreia a hepatite: médicos alertam sobre uso indiscriminado de ivermectina contra Covid-19. <https://www.cff.org.br/noticia.php?id=6242&titulo=De+diarreia+a+hepatite%3A+m%C3%A9dicos+alertam+sobre+uso+indiscriminado+de+ivermectina+contra+Covid19>. Acessado 13 de abril de 2021.
- Valécio, Marcelo. Uso de hepatite ivermectina causa medicamentosa em paciente com Covid-19 . <https://www.ictq.com.br/farmacia-clinica/2580-pneumologista-alerta-para-hepatite-medicamentosa-causada-pelo-uso-de-ivermectina-contra-covid-19>. Acessado 13 de abril de 2021